


BASAL HLR - VOKSNE

Tegn til liv?

Kontroller bevissthet



Kontroller pust
med åpen luftvei



Skaff hjelp



Start HLR

30:2



Hvis...

Hvis pasienten reagerer:
-Overvåk.
Skaff hjelp om nødvendig.

Hvis pasienten puster normalt:

1. Kontroller pusten i 1 min.
 2. Legg han på siden hvis han fortsatt puster normalt.
- Ring 1-1-3.
Kontroller pusten hyppig.

Start HLR hvis han slutter å puste normalt.

Hvis hjertestansen skyldes oksygenmangel, bør du gi fem innblåsninger før du starter HLR 30:2.

Hvis du ikke vil gi innblåsninger, eller ikke får det til, gi i alle fall brystkompresjoner fortløpende.

Hvordan...

Rist forsiktig.
Rop høyt på hjelp.

Åpne luftveien ved å bøye hodet bakover og løfte haka fram. Se, lytt og føl etter pust i inntil 10 sek.

Ring 1-1-3.
Få helst noen andre til å ringe.

30 brystkompresjoner

Trykk 4-5 cm dypt
Frekvens 100/min.

2 innblåsninger
Blås bare til brystkassen hever seg.

Fortsett med 30:2 runder til
- du får hjelp
- pasienten puster normalt
- du er nødt for å hvile.